



**Barem corectare  
Testul nr.1**

1. Edemul pulmonar acut, conduita de urgenta.
- pacientul este asezat în pozitie sezând cu picioarele atarnate la marginea patului.
  - se administrează O<sub>2</sub> pe masca sau endonazal cu debitul de 4-8l pe minut.
  - pe cale venoasa se administrează Furosemid 40-80mg iv ceea ce reduce presiunea hidrostatica în capilarul pulmonar înainte de a aparea efectul diuretic.
  - în perfuzie venoasa se adm NTG sau nitroprusiat de sodiu pentru corectia hipertensiunii arteriale si pentru reducerea intoarcerii venoase.
  - digoxin se administrează intravenos la pacientul nedigitalizat mai ales la cei cu FIA sau TPSV si la pacientii cu cardiomegalie.
  - aminofilinul intravenos combate bronhospasmul dat de edemul peribronsic si potenteaza actiunea diuretica a furosemidului
  - în lipsa raspunsului la masurile mentionate trebuie adm dopamina in asociere cu vasodilatatoare ,nitroprusiat sau NTG in perfuzie intravenos.

**(TRATAT DE INGRIJIRI MEDICALE VOL.III PAG.82 )**

**Barem – 50 puncte (50:7=7,14)**

**2.Ocluzia intestinală – tablou clinic**

Debutul este brusc, manifestat prin:

- durere – bruscă, intensă, continuă, sincopală, localizată la nivelul obstacolului, iradiază apoi în tot abdomenul;
- vărsături– apar precoce în ocluziile înalte și tardiv în ocluziile joase; inițial sunt bilio-alimentare, ulterior devin cu conținut intestinal sau cu aspect fecaloid;
- grețuri, sughit și eructații;
- întreruperea tranzitului pentru materii fecale și gaze se instalează precoce în ocluzii joase;
- distensia abdominală este urmarea încetării peristalticii și acumulării de lichide și gaze în intestin;
- semnele generale apar în funcție de cauza ocluziilor: anxietate, paloare, tahicardie, hipotensiune arterială în ocluziile prin strangulare; febră și frisoane în caz de infecții peritoneale; tahicardie, hipotensiune arterială, grețuri, stare confuză în ocluziile spastice sau intoxicații.

**Tratatul de ingrijiri medicale pentru asistenti medicali.**

**Vol II 352-353**

**Barem - 30 puncte (30:6=5)**

**3.Măsurarea și notarea scaunului (materiilor fecale)**

*Notarea grafică pe foaia de temperatură*

(I)-normal;

(/) -semilichid, foarte moale;

(-) -lichid;

(X)-mucos;

(Z)-grunjos;

(S)-sangvinolent;

(P)-cu puroi.

Se notează suma numărului scaunelor: de exemplu 12X sau 3S sau ZX sau 5I.

**Tratat de îngrijiri medicale pentru asistentii medicali**

**Vol. I 419**

**Barem - 20 puncte (20:7=2,85)**

